

Eltrombopag

Immunthrombozytopenie (ITP) » rezidiert/refraktär

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr. med. Andreas Hochhaus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de

www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1	Eltrombopag, ITP, relapsed/refractory.....	2
----------	---	----------

Eltrombopag

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Immunthrombozytopenie (ITP) » rezidiert/refraktär

Stand: November 2020

1 Eltrombopag, ITP, relapsed/refractory

Eltrombopag, ITP, relapsed/refractory																																	
		Facts	Appraisal																														
		EU Approval 2010																															
Parameter	Results¹⁴	HR¹⁵	p value																														
SR ¹¹	10 vs 60		p < 0.0001																														
OR ¹²	28 ¹⁹ vs 79 ¹⁹		p < 0.0001																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">5</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3b</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">3a</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2c</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2b</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2a</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1b</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1a</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Evidence (LoE)</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Clinical benefit (ESMO MCBS)</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> </table>					5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a	Evidence (LoE)										Clinical benefit (ESMO MCBS)									
	5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a																								
Evidence (LoE)																																	
Clinical benefit (ESMO MCBS)																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ■ curative ■ non-curative </div>																																	
Patients	Relapsed / refractory																																
Trial	Phase 3																																
Randomisation	2 : 1																																
N¹	197																																
New Therapy	Eltrombopag 50 mg																																
Control	Standard of Care																																
Publication	DOI:10.1016/S140-6736(10)60959-2																																

Legende:

¹ N - number of patients

¹¹ SR - sustained response

¹² OR - overall response

¹⁴ results for control, results for new therapy

¹⁵ hazard ratio for new therapy

¹⁹ platelets $\geq 50 \times 10^9/L$ in the first 6 weeks and at least once thereafter