



Enasidenib

Akute Myeloische Leukämie (AML) » IDH2mut » rezidiert/refraktär

Empfehlungen der Fachgesellschaft zum Einsatz neuer Arzneimittel

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. med. Claudia Baldus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de

www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Enasidenib, AML, IDH2mut, relapsed/refractory	2
--	----------

Enasidenib

Dokument: Fact Sheet

Spezifizierung: Akute Myeloische Leukämie (AML) » IDH2mut » rezidiviert/refraktär

Stand: Januar 2021

1 Enasidenib, AML, IDH2mut, relapsed/refractory

Enasidenib, AML, IDH2mut, relapsed/refractory

onkopedia				Facts	Appraisal	EU Approval Off-label									
<u>Parameter</u>	<u>Results</u> ¹⁴	<u>HR</u> ¹⁵	<u>p value</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">5</td> <td style="width: 12.5%;">4</td> <td style="width: 12.5%;">3b</td> <td style="width: 12.5%;">3a</td> <td style="width: 12.5%;">2c</td> <td style="width: 12.5%; background-color: black;">2b</td> <td style="width: 12.5%;">2a</td> <td style="width: 12.5%;">1b</td> <td style="width: 12.5%;">1a</td> </tr> </table>			5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a
5	4	3b	3a	2c	2b	2a	1b	1a							
RR ²	26.1 ¹⁹			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">1</td> <td style="width: 20%;">2</td> <td style="width: 20%;">3</td> <td style="width: 20%;">4</td> <td style="width: 20%;">5</td> </tr> </table>			1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5											
OS ⁵	9.3			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">1</td> <td style="width: 20%;">2</td> <td style="width: 20%;">3</td> <td style="width: 20%;">4</td> <td style="width: 20%;">5</td> </tr> </table>			1	2	3	4	5				
1	2	3	4	5											
EFS ⁸	19.7			<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> ■ curative ■ non-curative </div>											
Patients	AML, relapsed/refractory														
Trial	Phase III dose escalation and expansion trial														
Randomisation	- : -														
N ¹	176														
New Therapy	Enasidenib														
Control															
Publication	DOI:10.1182/blood-2017-04-779405														

Legende:

¹ N - number of patients

² RR - remission rate, in %

⁵ OS - overall survival in months

⁸ EFS - Event-Free Survival

¹⁴ results for control, results for new therapy

¹⁵ hazard ratio for new therapy

¹⁹ Complete Remission Rate (CR + CRi)