

Präzisionsonkologie

Leitlinie

Empfehlungen der Fachgesellschaft zur Diagnostik und Therapie
hämatologischer und onkologischer Erkrankungen

Herausgeber

DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und
Medizinische Onkologie e.V.
Bauhofstr. 12
10117 Berlin

Geschäftsführende Vorsitzende: Prof. Dr. med. Claudia Baldus

Telefon: +49 (0)30 27 87 60 89 - 0

info@dgho.de

www.dgho.de

Ansprechpartner

Prof. Dr. med. Bernhard Wörmann
Medizinischer Leiter

Quelle

www.onkopedia.com

Die Empfehlungen der DGHO für die Diagnostik und Therapie hämatologischer und onkologischer Erkrankungen entbinden die verantwortliche Ärztin / den verantwortlichen Arzt nicht davon, notwendige Diagnostik, Indikationen, Kontraindikationen und Dosierungen im Einzelfall zu überprüfen! Die DGHO übernimmt für Empfehlungen keine Gewähr.

Inhaltsverzeichnis

1 Zusammenfassung.....	2
2 Grundlagen	2
3 Auswahl der Pat.	3
4 Molekulare Analyse.....	6
5 Befunderstellung	7
6 Klinische Annotation.....	7
7 Therapieempfehlung/Molekulares Tumorboard	11
8 Follow-Up	12
9 Literatur	12
15 Anschriften der Verfasser	13
16 Offenlegung potentieller Interessenkonflikte	16

Präzisionsonkologie

Stand: Juli 2024

Erstellung der Leitlinie:

- [Regelwerk](#)
- [Interessenkonflikte](#)
- [Leitlinien-Report](#)

Autoren: Damian Rieke, Michael Bitzer, Annalen Bleckmann, Alexander Desuki, Thomas Ernst, Irene Esposito, Armin Gerger, Hanno Glimm, Peter Horak, Daniel Hübschmann, Anna Lena Illert, Volker Kunzmann, Sonja Loges, Ina Pretzell, Katja Schmitz, Andreas Seeber, Bärbel Söhlke, Andreas Wicki, Jürgen Wolf

1 Zusammenfassung

Der Begriff der Präzisionsonkologie wird uneinheitlich verwendet und umfasst dabei unter anderem den Einsatz zielgerichteter Therapeutika, neuer Sequenzierungsmethoden und histologieübergreifender Therapiestrategien auf der Basis molekularer Veränderungen. In dieser Leitlinie meint „Präzisionsonkologie“ den Einsatz einer breiten molekularen Tumorcharakterisierung mit dem Ziel einer personalisierten Therapiesteuerung.

Molekulare Testung und molekular stratifizierte Therapien sind für zahlreiche Tumorentitäten (z.B. nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom, kolorektales Karzinom, hämatologische Neoplasien u.v.a.) bereits Standard. Hierbei wird auf die jeweiligen entitätsspezifischen Leitlinien verwiesen.

Neben der leitliniengerechten personalisierten Onkologie können jedoch auch bei Patientinnen und Patienten (Pat.) mit weiteren Tumorentitäten effektive Therapieoptionen durch eine molekulare Tumoranalyse identifiziert werden. Dies wird durch die zunehmende Anzahl prädiktiver Biomarker mit entitätsübergreifender Relevanz verdeutlicht. Hierbei können prädiktive Biomarker durch Veränderungen in wenigen definierten Molekülen charakterisiert werden (*BRAF*-Mutationen, *NTRK*-Fusionen) oder als komplexe Biomarker auf der Identifikation von zahlreichen Alterationen beruhen (Mikrosatelliteninstabilität (MSI), Tumormutationslast (TMB), oder Defizienz der homologen DNA-Rekombination (HRD)). Hinzu kommt, dass der Nachweis der Biomarker in verschiedenen Analyten (DNA, RNA, Protein) und durch eine zunehmende Zahl an (Hochdurchsatz)Methoden erfolgen kann. Aus diesem Grund werden oftmals breite molekulare Analysen durchgeführt, die zahlreiche mögliche Biomarker erfassen. Zudem können auch im Rahmen einer leitliniengerechten molekularen Diagnostik Veränderungen gefunden werden, die potenziell therapeutisch relevant sind, aber nicht durch aktuelle Leitlinien abgedeckt sind.


Die adäquate Indikationsstellung, Testauswahl und klinische Interpretation molekularer Alterationen mit dem Ziel einer evidenzbasierten personalisierten Therapiesteuerung trotz oftmals nur limitierter klinischer Daten ist eine Herausforderung und erfordert eine multidisziplinäre Expertise im Rahmen spezialisierter molekularer Tumorboards.

2 Grundlagen

Die Durchführung und Interpretation einer breiten molekularen Testung erfordern eine multidisziplinäre Expertise. Sie beinhalten die korrekte Indikationsstellung, die molekulare Analyse selbst, ihre informatorische Auswertung, die Interpretation der Ergebnisse und ihre Einordnung in den klinischen Kontext mit dem Ziel einer Therapieempfehlung [15]. Ein schematischer Ablauf von Arbeitsschritten in der Präzisionsonkologie ist in [Abbildung 1](#) dargestellt.

Bei klarer, d.h. Leitlinien-basierter Indikationsstellung und entsprechender Zulassung, genügt die Vorstellung der Pat. in einem Organtumorboard (z.B. typische *EGFR*-Mutation beim NSCLC, *BRAF* p.V600E Mutation beim Melanom, *RET*-Mutationen beim medullären Schilddrüsenkarzinom). Bei komplexen, nicht durch Leitlinien abgedeckten Befunden, zumeist im Rahmen von Rebiopsien in der Rezidivsituation, sollte die Vorstellung in einem molekularen Tumorboard (MTB) erfolgen.

Abbildung 1: Schematische Übersicht über Arbeitsschritte in der Präzisionsonkologie



3 Auswahl der Pat.

Der Indikationsstellung zur molekularen Diagnostik sollte, außerhalb von klinischen Studien, stets eine mögliche klinische Relevanz des Ergebnisses zugrunde liegen. Berücksichtigt werden hierbei die Therapiefähigkeit der Pat., die aktuellen Leitlinien, der Zulassungsstatus der möglicherweise aus der Diagnostik resultierenden Therapie bzw. neueste klinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse sowie ggf. der Beschluss eines (molekularen) Tumorboards.

Zunehmend wird molekulare Diagnostik in die Leitlinien-basierte Standardtherapie in der Erstlinienbehandlung oder im Rezidiv aufgenommen und gehört zur Standarddiagnostik für die betreffende Tumorentität. Beispiele sind viele Treiberalterationen beim NSCLC, *BRAF*-Mutationen beim Melanom und beim Kolonkarzinom, *HER2*-Amplifikationen beim Mammakarzinom, *RET*-Mutationen beim medullären Schilddrüsenkarzinom und viele mehr. Bei diesen Pat. ist nach erfolgter molekularer Diagnostik für die Therapieentscheidung in aller Regel die Vorstellung in einem Organtumorboard ausreichend.

Weitere Indikationen für molekulare Diagnostik beinhalten die Erfüllung der Einschlusskriterien für molekular-stratifizierte klinische Studien. Auch hier rückt die molekulare Diagnostik immer mehr in frühe Linien der Behandlung. Beispielsweise integrieren die Zentren des nationalen Netzwerks Genomische Medizin Lungenkrebs (nNGM) studienrelevante molekulare Marker zusätzlich zu den zugelassenen molekularen Therapieoptionen in ihre NGS-basierte Primärdiagnostik.

Bei Pat. nach Versagen der Standardtherapien inkl. der zugelassenen molekular-gesteuerten Therapien, kann die Indikationsstellung für eine (ggf. erweiterte) molekulare Diagnostik in einem Organtumorboard gestellt werden. Die resultierenden Befunde sollten dann in einem molekularen Tumorboard erörtert werden. Solche molekularen Tumorboards sind bei den meisten onkologischen Spitzenzentren (CCCs) und zunehmend auch an weiteren Zentren etabliert.

Entsprechend der Empfehlungen des Deutschen Netzwerk für Personalisierte Medizin (DNPM), welche auch in den Zertifizierungskriterien von OnkoZert für Zentren für Personalisierte Medizin enthalten sind, sind folgende Einschlusskriterien für den Zugang zu molekularen Tumorboards (mit entsprechender breiter molekularer Charakterisierung) benannt ([Tabelle 1](#))

Tabelle 1: Zugangskriterien zu molekularen Tumorboards im Rahmen des deutschen Netzwerks für personalisierte Medizin (DNPM) [9].


Fortgeschrittene oder seltene Krebserkrankung
Leitliniengerechte Therapie absehbar durchlaufen
Nach Einschätzung der klinischen Parameter in der Lage eine molekular-basierte Therapie zu erhalten
Stimmen prinzipiell einer möglichen Therapie auf Basis der molekularen Befunde zu

Die Entscheidung zu einer erweiterten molekularen Diagnostik nach Ausschöpfen der Standardtherapien erfordert zumeist eine individuelle Entscheidungsfindung in einer interdisziplinären Tumorkonferenz. Insbesondere bei Pat. mit rasch progredienten Tumorerkrankungen sollte die Wahl der geeigneten Methode, die erwartbare Dauer der Diagnostik und der nachfolgenden klinischen Umsetzung beachtet und entsprechende Analysen daher frühzeitig eingeleitet werden.

Zunehmend wird die molekulare Charakterisierung von Tumoren im Rahmen der Routinediagnostik und basierend auf Leitlinien auch schon früh im Behandlungsverlauf, beispielsweise vor der Erstlinientherapieentscheidung, eingesetzt. In der Mehrzahl der Fälle ist hier kein molekulares Tumorboard notwendig. Mit Zunahme des Einsatzes von Methoden der parallelen DNA- und RNA-Sequenzierung zahlreicher Genbereiche finden sich jedoch auch genetische Aberrationen, deren biologische und klinische Relevanz nicht gesichert sind (Beispiel: atypische *EGFR*-Mutationen) oder vielschichtige molekulare Veränderungen wie das gleichzeitige Vorliegen mehrerer potenziell prädiktiver Biomarker. Die klinische Einordnung solcher Befunde, sowie von Varianten unklarer Signifikanz (VUS) kann die zusätzliche Einschaltung eines Molekularen Tumorboards erforderlich machen.

[Abbildung 2](#) stellt ein mögliches Schema zur Integration einer breiten molekularen Diagnostik bzw. spezialisierten Diskussion von Befunden in den klinischen Behandlungs-/Entscheidungs-Algorithmus dar.

Abbildung 2: Algorithmus zur Integration erweiterter molekularer Diagnostik in den klinischen Behandlungs-/Entscheidungs-Ablauf.



Legende:

¹ Biomarker für eine leitliniengerechte Therapieoption;

² Potenzielle Biomarker ohne leitliniengerechte und/oder ohne zugelassene Therapieoption und/oder Alternativen mit unklarer klinischer Konsequenz nach Ansicht des/der Behandelnden;

Typischerweise erfolgt eine erweiterte molekulare Diagnostik mit nachfolgender Diskussion der Befunde in einer molekularen Tumorkonferenz dabei nach Ausschöpfen leitliniengerechter Therapieoptionen in späteren Therapielinien. Zunehmend werden größere NGS-Panel in der Routinediagnostik jedoch auch frühzeitig eingesetzt, wobei immer wieder atypische Befunde wie seltene Varianten oder vielschichtige molekulare Befunde identifiziert werden. Dies kann auch das frühzeitigere Einbeziehen einer molekularen Tumorkonferenz erforderlich machen.

Neben der Pat.-Auswahl (siehe [Tabelle 1](#)), spielt auch die Auswahl des zu untersuchenden (Tumor-) Materials eine Rolle. Hierbei ist sowohl die Repräsentativität des vorliegenden Materials, als auch die Fixierungstechnik zu beachten. [Tabelle 2](#) listet Kriterien auf, die bei der Entscheidung zu einer erneuten Probenentnahme herangezogen werden können.

Tabelle 2: Mögliche Kriterien für eine Entscheidung für oder gegen eine erneute Probenentnahme. Es ist zu beachten, dass diese Kriterien im Einzelfall gut abgewogen und diskutiert werden müssen.

Analyse aus vorliegendem Gewebe	Erneute Probenentnahme
Tumorgewebe aus der aktuellen Erkrankungssituation vorhanden	Tumorgewebe aus anderer Krankheitssituation (z.B. Primarius vor definitiver Therapie)
Primäre Resistenz auf letzte Therapielinie ohne erwartbare molekulare Veränderung	Sekundäre Resistenz auf letzte Therapielinie mit erwartbarer molekularer Veränderung (z.B. zielgerichtete Substanzen)
Geplante molekulare Analyse aus vorliegendem Material möglich	Geplante molekulare Analyse aus vorliegendem Material nicht möglich
Erneute Probenentnahme nicht möglich oder risikoreich	Erneute Probenentnahme einfach und risikoarm durchführbar

Neben einer erneuten Probenentnahme können für manche Fragestellungen auch Liquid Biopsy-Techniken eingesetzt werden. Zu berücksichtigen ist, dass diese bei vielen Markern, v.a. Fusionsgenen und Amplifikationen, zwar eine hohe Spezifität, jedoch (noch) eine geringere Sensitivität im Vergleich zu Gewebebiopsien haben. Insbesondere in der Primärdiagnostik bleibt daher die Gewebediagnostik aktuell der Standard, während die Liquid Biopsy zunehmend in der

Rezidivsituation bei schwieriger Biopsieentnahme und zunehmend im Rahmen klinischer Studien auch zum Therapiemonitoring eingesetzt wird.

4 Molekulare Analyse

Therapeutisch relevante molekulare Veränderungen können auf zahlreichen Ebenen der zellulären Regulation identifiziert werden. [Tabelle 3](#) fasst mögliche Ebenen zellulärer Dysregulation zusammen.

Tabelle 3: Zusammenfassung möglicher Ebenen genetischer Dysregulation.

Ebene der molekularen Veränderung	Beschreibung	Nachweis
Genvarianten	Veränderungen auf Genebene, die über Veränderungen der Nukleinbasen zu Funktionsänderung oder -verlust des Genprodukts führen	Nachweis von Veränderungen der Nukleinsäuresequenz, z.B. mittels Sanger- oder Next-Generation-Sequenzierung (NGS)
Strukturelle Veränderung	Veränderungen auf (sub-) chromosomaler Ebene, die über Fusionsgene und Kopienzahlveränderungen wie Amplifikationen oder Deletionen zu einer Funktionsänderung, -verlust oder Dysregulation des Genprodukts führen	Nachweis struktureller chromosomaler Veränderungen z.B. mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisation (FISH) oder zumeist RNA-basierter Next-Generation-Sequenzierung
Epigenetische Veränderung	Veränderungen regulatorischer Elemente wie DNA- oder Histonmodifikationen, die zu einer Dysregulation des Genprodukts führen	Nachweis z.B. mittels Bisulfit-Sequenzierung und/oder Methylierungsarray
Quantitative Genproduktveränderung	Veränderungen in der Menge relevanter Genprodukte, wie z.B. eine Proteinüberexpression	Nachweis der verstärkten oder verminderten Expression von Genprodukten z.B. mittels Immunhistochemie, Proteomics, Phosphoproteomics, Multiplex Technologien, RNA-Sequenzierung, Quantitativer PCR, NanoString
Komplexe Biomarker	Anzahl und Art der Summe molekularer Veränderungen können als komplexe Biomarker quantifiziert werden und z.B. als Tumormutationslast oder Homologe-Rekombinations-Defizienz- (HRD-) Scores als eigener Biomarker gewertet werden	Nachweis über spezifische Berechnungsverfahren basierend auf DNA-Analysen

Neue Technologien erlauben eine schnelle und gleichzeitige Analyse zahlreicher möglicher Biomarker mit Hochdurchsatzverfahren. Im Bereich der Präzisionsonkologie spielt – neben der Immunhistochemie – dabei die DNA- und RNA-Sequenzierung aktuell die wichtigste Rolle. Mögliche diagnostische Verfahren sind in [Tabelle 4](#) zusammengefasst [1, 8].

Tabelle 4: Beschreibung möglicher Sequenzierungsverfahren.

Verfahren	Beschreibung
Einzelgensequenzierung	Analyse der Basenfolge eines einzelnen Genbereichs, in der Regel mittels Sanger-Sequenzierung zur Identifikation von Genmutationen. Diese Analyse wird in der Regel ohne parallele Keimbahnanalyse als Kontrolle durchgeführt.
Genpanel-Sequenzierung	Parallele Analyse der Basenfolgen zahlreicher Genbereiche mittels Next-Generation Sequencing (NGS). Je nach Art und Größe des Genpanels können gleichzeitig bis zu mehrere hundert Genmutationen und zum Teil auch strukturelle Veränderungen wie Amplifikationen detektiert werden. RNA-basierte Genpanel erlauben ebenfalls die Identifikation von Fusionsgenen. Große Genpanel erlauben zudem eine Abschätzung komplexer Biomarker wie die Tumormutationslast. Diese Analyse kann ohne parallele Keimbahnanalyse als Kontrolle durchgeführt werden.
Exomsequenzierung	Parallele Analyse der Basenfolgen der proteinkodierenden Regionen (Exom) des Genoms mittels NGS. Hierüber werden Genmutationen, Kopienzahlveränderungen und komplexe Biomarker erfasst. Diese Analyse wird mit paralleler Keimbahnanalyse als Kontrolle durchgeführt.
Genomsequenzierung	Parallele Analyse der Basenfolgen des gesamten Genoms mittels NGS. Hierüber werden Genmutationen, strukturelle Veränderungen und komplexe Biomarker erfasst. Diese Analyse wird mit paralleler Keimbahnanalyse als Kontrolle durchgeführt.

Die Auswahl einer geeigneten molekularen Diagnostik sollte zudem zuvor erfolgte Analysen, sowie die Vortestwahrscheinlichkeit relevanter Biomarker berücksichtigen (Tabelle 8 und 9).

5 Befunderstellung

Die Durchführung der molekularen Testung und Identifikation molekularer Veränderungen ist ein weitgehend standardisierter Prozess und Domäne u.a. der Humangenetik, (Molekular-)Pathologie und Bioinformatik und sollte in einer qualitätsgesicherten Umgebung erfolgen, nach Möglichkeit in einem für die molekulare Diagnostik akkreditierten Institut/Labor. Idealerweise sollte die molekulare Diagnostik in ein klinisches Umfeld eingebettet sein, welches die notwendige Interdisziplinarität in Bezug auf die Interpretation und klinische Annotation der Ergebnisse sicherstellt.

Der Befund sollte Informationen zu genutztem (Tumor-)Material, Materialqualität, Tumorzellgehalt, Art der durchgeführten Analyse, Auflistung identifizierter Alterationen in standardisierter Codierung, Variantenallelfrequenz, sowie eine funktionelle Bewertung der Varianten umfassen. Für die Bewertung potentieller Keimbahnvarianten ist die Humangenetik einzubeziehen.

Die funktionelle Bewertung molekularer Veränderungen sollte dabei auf der Basis vorhandener Leitlinien und SOPs erfolgen (z.B. [6]).

6 Klinische Annotation

Spezifische molekulare Veränderungen können relevante Informationen für das klinische Management von Tumorerkrankungen enthalten. Die Identifikation dieser Biomarker ist daher das Ziel einer molekularen Testung. Die klinische Annotation einer Variante dient ihrer Bewertung als Biomarker. Dabei sind folgende mögliche Biomarker zu unterscheiden (Tabelle 5) [16].

Tabelle 5: Übersicht über verschiedene Biomarkerarten

Biomarker	Beschreibung
Diagnostisch	Information über die Art der Erkrankung
Prognostisch	Information über den Krankheitsverlauf
Prädiktiv	Information über die Wahrscheinlichkeit des Ansprechens auf eine bestimmte Therapie
Pharmakogenomisch	Information über Pharmakokinetik und Arzneimittelinteraktionen
Prädisponierend	Information über die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer bestimmten Erkrankung

Eine Annotation als prädiktiver Biomarker erfordert häufig eine umfassende Literaturrecherche. Zahlreiche Datenbanken erlauben eine vereinfachte Suche von Informationen, wobei der Inhalt der Datenbanken häufig nicht überlappend (z.B. civicdb.org, oncokb.org, <https://ckb.jax.org/>) und die Analyse der Primärliteratur zur Einordnung der Befunde unerlässlich ist [14].

Zur Bewertung des entsprechenden Biomarkers vor dem Hintergrund der jeweiligen Tumorentität wurden Evidenzlevel definiert, welche zur Beurteilung herangezogen werden sollten [7, 10, 13]. Im deutschsprachigen Raum sind die NCT/ZPM-Evidenzlevel am weitesten verbreitet. Neben diesen existieren weitere Evidenzlevel wie z.B. AMP/ASCO/ACP [11] oder ESMO-ESCAT [12].

Neben der Interpretation potenzieller prädiktiver Biomarker sollten jedoch auch weitere relevante Biomarker beurteilt werden (z.B. DPYD-Diagnostik, falls miterfasst). Im Falle einer durchgeführten Keimbahndiagnostik erfordert dies die Expertise und Mitbeurteilung durch die Humangenetik. Aufgrund des hohen Zeitaufwands und der nötigen Recherchearbeit findet die

klinische Einordnung und Interpretation der Befunde oft vor der abschließenden Entscheidung über eine klinische Anwendung statt.

Tabelle 6: Evidenzlevel nach NCT/ZPM [10]

Datenquelle	Evi- denz- level	Beschreibung
Gleiche Tumorentität	m1A	In der gleichen Tumorentität wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer Biomarker-stratifizierten Kohorte einer adäquat gewerten prospektiven Studie oder Metaanalyse gezeigt.
	m1B	In der gleichen Tumorentität wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer retrospektiven Kohorte oder Fall-Kontroll-Studie gezeigt.
	m1C	Ein oder mehrere Fallberichte in der gleichen Tumorentität .
Andere Tumorentität	m2A	In einer anderen Tumorentität wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer Biomarker-stratifizierten Kohorte einer adäquat gewerten prospektiven Studie oder Metaanalyse gezeigt.
	m2B	In einer anderen Tumorentität wurde der prädiktive Wert des Biomarkers oder die klinische Wirksamkeit in einer retrospektiven Kohorte oder Fall-Kontroll-Studie gezeigt.
	m2C	Unabhängig von der Tumorentität wurde beim Vorliegen des Biomarkers eine klinische Wirksamkeit in einem oder mehreren Fallberichten gezeigt.
In vitro oder Tiermodell	m3	Präklinische Daten (<i>in vitro</i> / <i>in vivo</i> -Modelle, funktionelle Untersuchungen) zeigen eine Assoziation des Biomarkers mit der Wirksamkeit der Medikation, welche durch eine wissenschaftliche Rationale gestützt wird.
Biologische Rationale	m4	Eine wissenschaftliche, biologische Rationale legt eine Assoziation des Biomarkers mit der Wirksamkeit der Medikation nahe, welche bisher nicht durch (prä)klinische Daten gestützt wird.

Legende:

Zusatzverweise:

is - In situ-Daten aus Untersuchungen an Pat.-Material (z.B. IHC, FISH) unterstützen den Evidenzgrad. Die unterstützende Methode kann in Klammern zusätzlich angegeben werden, z.B. Evidenzgrad 3 is (IHC).

iv - In vitro-Daten / in vivo-Modelle (z.B. PDX-Modelle) derselben Tumorentität unterstützen den Evidenzgrad. Die unterstützende Methode kann in Klammern angegeben werden, z.B. Evidenzgrad 2 iv (PDX).

Z - Zusatzverweis für Zulassungsstatus (Z= EMA-Zulassung liegt vor; Z (FDA)= nur FDA-Zulassung vorhanden)

R - Verweis, dass es sich hierbei um einen Resistenzmarker für eine bestimmte Therapie handelt

Es existieren zunehmend prädiktive Biomarker mit einer entitätsübergreifenden Zulassung zielgerichteter Medikamente (entsprechend mind. ESCAT Level I-C, NCT m1A, JCR-Tier 1 A.1). Entsprechende prädiktive Biomarker mit FDA-Zulassung sind in [Tabelle 7](#) dargestellt. In Europa existieren derzeit lediglich zwei entitätsübergreifende Zulassungen für *NTRK*-Inhibitoren und *RET*-Inhibitoren beim Vorliegen von *NTRK1-3* bzw. *RET*-Fusionen.

Tabelle 7: Übersicht prädiktiver Biomarker und assoziierter Therapieoptionen mit entitätsübergreifender Wirksamkeit und Zulassung durch die FDA.

Molekulare Alteration	Therapie
<i>NTRK</i> -Fusionen	<i>NTRK</i> -Inhibition
<i>RET</i> -Fusion	<i>RET</i> -Inhibition
<i>BRAF</i> p.V600E-Mutation	<i>BRAF</i> -Inhibition (ggf. + MEK-Inhibitor; ggf. + <i>EGFR</i> -Inhibition bei kolorektalen Karzinomen)
Mismatch-Repair Defizienz (MSI-H / dMMR)	Immuncheckpointinhibition
Hohe Tumormutationslast (TMB)	Immuncheckpointinhibition
<i>HER2</i> -positiv (Immunhistochemie 3+)	<i>HER2</i> -ADC

[Tabelle 8](#) fasst entsprechend Prävalenzen dieser Biomarker (vgl. [Tabelle 7](#)) in verschiedenen Tumorerkrankungen zusammen.

Tabelle 8: Populationsdaten aus der AACR GENIE Kohorte* [5].

Tumorentität	<i>BRAF</i> ^{V600E}	<i>RET</i> -Fusion	<i>NTRK</i> -Fusion	TMB-high (≥ 10 Mut/Mb)	MMRd/MSI-H	<i>HER2</i> -Positivität (IHC 3+)
Ampullenkarzinom	1. % (<i>n</i> = 4)	0% (<i>n</i> = 0)	5,1% (<i>n</i> = 2)	19,3% (<i>n</i> = 68)		
Analkarzinom	0% (<i>n</i> = 0)	2% (<i>n</i> = 1)	2% (<i>n</i> = 1)	19,9% (<i>n</i> = 73)		
Appendixkarzinom	1,2% (<i>n</i> = 9)	0% (<i>n</i> = 0)	2,1% (<i>n</i> = 1)	18,5% (<i>n</i> = 137)		
Blasenkarzinom	0,1% (<i>n</i> = 6)	0,3% (<i>n</i> = 3)	1% (<i>n</i> = 9)	38,8% (<i>n</i> = 1.813)	0,49% (<i>n</i> = 2)	12,4% (<i>n</i> = 59)
Mammakarzinom	0,1% (<i>n</i> = 17)	0,4% (<i>n</i> = 13)	1,4% (<i>n</i> = 41)	11,7% (<i>n</i> = 1.874)	1,53% (<i>n</i> =16)	10,5% (<i>n</i> = 388)
Cancer of unknown primary (CUP)	1,6% (<i>n</i> = 86)	1% (<i>n</i> = 8)	1,5% (<i>n</i> = 12)	23,4% (<i>n</i> = 1.249)		2,1% (<i>n</i> = 29)
Zervixkarzinom	0% (<i>n</i> = 0)	0% (<i>n</i> = 0)	0% (<i>n</i> = 0)	18,2% (<i>n</i> = 158)	2,62% (<i>n</i> =8)	3,9% (<i>n</i> = 23)
Kolorektales Karzinom	7,9% (<i>n</i> = 1.228)	0,9% (<i>n</i> = 15)	1,7% (<i>n</i> = 29)	31,9% (<i>n</i> = 4.937)	14,47% (<i>n</i> =94)	1,8% (<i>n</i> = 80)
Endometriumkarzinom	0,1% (<i>n</i> = 4)	0,1% (<i>n</i> = 1)	0,5% (<i>n</i> = 4)	30,4% (<i>n</i> = 1.549)	31,37% (<i>n</i> =170)	3% (<i>n</i> = 111)
Ösophagus/Magenkarzinom	0,1% (<i>n</i> = 6)	0,7% (<i>n</i> = 8)	1,8% (<i>n</i> = 20)	17,2% (<i>n</i> = 817)	13,9% (<i>n</i> =87)	11,3% (Ösophagus/GEJ <i>n</i> = 71), 4,7% (Magenkarzinom, <i>n</i> = 27)
Gastrointestinale neuro-endokrine Tumore	3,7% (<i>n</i> = 25)	0% (<i>n</i> = 0)	5,4% (<i>n</i> = 3)	6,6% (<i>n</i> = 45)		0% (<i>n</i> = 0/1136)
Gastrointestinaler Stromatumor (GIST)	0,4% (<i>n</i> = 6)	0% (<i>n</i> = 0)	0,8% (<i>n</i> = 1)	14,6% (<i>n</i> = 226)		0% (<i>n</i> = 0/143)
Keimzelltumor	0,1% (<i>n</i> = 1)	0% (<i>n</i> = 0)	1,1% (<i>n</i> = 1)	2,9% (<i>n</i> = 31)	0% (<i>n</i> =0/150)	2,4% (<i>n</i> = 1)
Gliome	3,9% (<i>n</i> = 392)	0,3% (<i>n</i> = 6)	1,8% (<i>n</i> = 43)	11,1% (<i>n</i> = 1.121)	0,25% (<i>n</i> =1, GBM)	0% (<i>n</i> = 0/41)
Kopf-Hals-Tumore	0,05% (<i>n</i> = 1)	0,8% (<i>n</i> = 2)	0,8% (<i>n</i> = 2)	24,9% (<i>n</i> = 548)	0,78% (<i>n</i> =4)	1,3% (<i>n</i> = 7)
Hepatobiliäre Karzinome	1,1% (<i>n</i> = 39)	0,5% (<i>n</i> = 3)	1,6% (<i>n</i> = 10)	12% (<i>n</i> = 413)	1,35% (<i>n</i> =1)	6,3% (extrahepatisch <i>n</i> = 5), 0,6% (intrahepatisch, <i>n</i> = 2), 0,4% (hepatozellulär <i>n</i> = 1)
Histiozytose	17,3% (<i>n</i> = 91)	8% (<i>n</i> = 2)	0% (<i>n</i> = 0)	2,7% (<i>n</i> = 14)		
Melanom	20,3% (<i>n</i> = 1.379) ¹	0,1% (<i>n</i> = 1)	2,6% (<i>n</i> = 18)	49,1% (<i>n</i> = 3.338)	0,64% (<i>n</i> =3)	0,1% (<i>n</i> = 1)
Mesotheliom	0,1% (<i>n</i> = 1)	0% (<i>n</i> = 0)	1% (<i>n</i> = 2)	2,8% (<i>n</i> = 27)	2,41% (<i>n</i> =2)	
Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC)	1,4% (<i>n</i> = 329)	5,7% (<i>n</i> = 215)	0,9% (<i>n</i> = 33)	33,8% (<i>n</i> = 8.142)	0,6% (<i>n</i> =6)	1,1% (<i>n</i> = 49)
Ovarialkarzinom	0,9% (<i>n</i> = 56)	0% (<i>n</i> = 0)	0,6% (<i>n</i> = 7)	12,8% (<i>n</i> = 783)	1,37% (<i>n</i> =6)	1,6% (epithelial, <i>n</i> = 122), 0,4% (nicht-epithelial <i>n</i> = 1)
Pankreaskarzinom	0,4% (<i>n</i> = 26)	0,1% (<i>n</i> = 1)	1,8% (<i>n</i> = 15)	11,9% (<i>n</i> = 820)	0% (<i>n</i> =0/183) -0,8% (<i>n</i> =7/833)	0,7% (<i>n</i> = 14)
Nebenschilddrüsenkarzinom	6,9% (<i>n</i> = 2)	0% (<i>n</i> = 0) ^a	0% (<i>n</i> = 0) ^a	44,8% (<i>n</i> = 13)		

Tumorentität	<i>BRAF</i> ^{V600E}	<i>RET</i> -Fusion	<i>NTRK</i> -Fusion	TMB-high (≥ 10 Mut/Mb)	MMRd/MSI-H	<i>HER2</i> -Positivität (IHC 3+)
Peniskarzinom	0% (n = 0)	0% (n = 0)	0% (n = 0)	25,4% (n = 16)		0% (n = 0/10)
Prostatakarzinom	0,02% (n = 1)	0,2% (n = 4)	0,4% (n = 8)	5,4% (n = 312)	0,6% (n=3)	0,6% (n = 2/350)
Nierenzellkarzinom	0% (n = 0)	0,5% (n = 1)	0% (n = 0)	6,2% (n = 160)	0,7% (n=5)	0% (n = 0/531)
Speicheldrüsenkarzinom	0,7% (n = 7)	0,5% (n = 1)	15,3% (n = 29)	9,2% (n = 93)		
Keimstrang-Stroma Tumore	0% (n = 0)	0% (n = 0)	0% (n = 0)	4,6% (n = 11)		
Nichtmelanozytärer Hautkrebs	3,8% (n = 46)	1,6% (n = 3)	6,4% (n = 12)	36,9% (n = 448)		
Dünndarmkarzinom	2,6% (n = 12)	0% (n = 0)	0% (n = 0)	35,3% (n = 164)		
Kleinzelliges Lungenkarzinom (SCLC)	0% (n = 0)	0,7% (n = 1)	0,7% (n = 1)	35,8% (n = 332)		0% (n = 0/322)
Weichteilsarkome	0,3% (n = 16)	0,3% (n = 4)	2,3% (n = 34)	5,8% (n = 287)	0,78% (n=2)	0% (n = 0/1211)
Schilddrüsenkarzinom	40,2% (n = 922)	36% (n = 96)	17,2% (n = 46)	10,1% (n = 231)	0% (n=0/496)	0% (n = 0/158)
Uterine Sarkome	0,1% (n = 1)	0,6% (n = 1)	2,3% (n = 4)	6% (n = 42)	3,51% (n=2)	
Vaginalkarzinome	0% (n = 0)	0% (n = 0)	0% (n = 0)	21,6% (n = 36)		
Vulvakarzinome	0% (n = 0)	0% (n = 0)	0% (n = 0)	33,3% (n = 1)		
Wilms-Tumor	2,1% (n = 4)	0% (n = 0)	0% (n = 0)	4,7% (n = 9)	2,44% (n=1)	

Legende:

¹ Höhere *BRAF* p.V600E-Mutationsfrequenzen beim kutanen Melanom sind in früheren Publikationen beschrieben (z.B. 39%) [3].

*Daten für MMRd/MSI-h und *HER2*-Positivität (IHC 3+) sind nicht in der GENIE-Kohorte vorhanden und aus verfügbaren Publikationen abgeleitet [2, 17].

Tabelle 9: Prävalenz weiterer molekularer Veränderungen (mind. NCT-Evidenzlevel 2) in verschiedenen Tumorentitäten. (nach: [4])

	ALK-Fusionen	BRCA1 SNV	BRCA2 SNV	EGFR SNV	ERBB2 Amplifikation	EZH2 SNV	FGFR2 Fusionen	FGFR3 SNV	FGFR3 Fusionen	IDH1 SNV	IDH2 SNV	KIT SNV	KRAS p.G12C	PDGFRA SNV	PIK3CA SNV	CARET SNV	ROS1 Fusionen
Blasenkarzinom	0,1%	1,3%	2,2%	2,5%	4,3%	0,6%	0,1%	21,9%	2,0%	0,2%	0,1%	0,1%	0,4%		19,4%	0,1%	
Mammakarzinom	n/a	1,3%	1,9%	1,3%	10,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%		0,3%	0,1%	0,2%	38,1%	0,1%	0,1%
Zervixkarzinom	n/a	1,1%	0,9%	0,2%	2,1%	0,3%		0,9%	0,6%				0,5%		27,6%		0,2%
Cholangiokarzinom	n/a	0,7%	2,0%	1,1%	2,2%	0,4%	7,3%		0,4%	14,5%	3,5%	0,1%	1,0%	0,3%	4,5%	0,1%	0,2%
Kolorektales Karzinom	0,1%	0,9%	2,2%	1,4%	1,4%	0,2%	0,1%	0,1%		0,5%	0,1%	0,2%	2,9%	0,1%	17,8%	0,2%	
Melanom	0,2%	0,9%	1,4%	0,9%		1,1%		0,1%		2,6%	0,3%	3,9%		0,8%	2,2%	0,1%	0,1%
Endometriumkarzinom	n/a	1,4%	4,1%	1,2%	3,5%	1,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,3%		0,1%	1,2%	0,3%	48,5%	0,3%	
Ösophagogastrisches Karzinom	n/a	0,8%	1,7%	4,8%	10,8%	0,5%	0,6%	0,1%	0,1%		0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	7,8%	0,3%	0,2%
Gallenblasenkarzinom	n/a	1,8%	3,6%	3,1%	5,4%				0,4%	0,4%			0,9%		10,8%		
GIST	0,1%		0,1%			0,1%				0,1%	0,1%	78,9%		10,3%	1,3%	0,1%	
Kopf-Hals Tumor	0,1%	1,1%	1,0%	4,5%	0,7%	0,2%	0,1%	1,7%	0,1%	0,1%	0,5%	0,5%	0,2%	0,4%	18,4%	0,1%	
NSCLC	2,0%	0,6%	0,9%	26,9%	0,8%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,3%	0,1%	0,4%	11,3%	0,3%	5,2%	0,1%	0,8%
Ovarialkarzinom	0,1%	5,7%	2,9%	0,4%	1,7%	0,3%	0,1%		0,1%		0,1%	0,1%	0,4%	0,1%	9,9%	0,1%	
Pankreaskarzinom	0,2%	0,6%	2,4%	0,2%	0,7%	0,2%	0,2%			0,2%			1,1%		2,1%	0,1%	0,2%
Prostatakarzinom	n/a	0,5%	5,0%	0,4%	0,1%	0,3%			0,1%	0,4%		0,1%		0,1%	3,8%	0,1%	0,1%
Nierenzellkarzinom	0,2%	0,4%	0,6%	0,3%		0,3%		0,1%				0,2%	0,1%	0,2%	2,9%		
Speicheldrüsenkarzinom	0,8%	0,6%	0,5%	0,5%	4,6%		0,1%			0,5%	0,1%	1,4%	0,1%	1,3%	8,7%		0,3%
Schilddrüsenkarzinom	0,4%	0,3%	0,9%	0,2%		0,1%	0,1%	0,1%		0,1%		0,2%	0,2%	0,1%	3,7%	8,1%	

7 Therapieempfehlung/Molekulares Tumorboard

Die abschließende Anwendung der identifizierten und bewerteten Biomarker in der konkreten klinischen Situation erfordert eine breite multidisziplinäre Expertise und sollte in ausgewiesenen bzw. zertifizierten molekularen Tumorboards stattfinden. Nach den Kriterien des deutschen

Netzwerks für personalisierte Medizin (DNPM; [9]) umfassen die teilnehmenden Disziplinen eines MTB-Teams mindestens die Hämatologie und internistische Onkologie, Pathologie, Molekularpathologie, Molekularbiologie, Bioinformatik, Humangenetik sowie fallbezogen zuständige Fachdisziplinen und Radiologie nach Bedarf. Zudem sollte dieses Team eine ausreichende und umfassende Expertise in der Interpretation, Bewertung und Einordnung molekularer Befunde in den klinischen Therapieverlauf haben, die durch eine ausreichende Fallzahl von MTB-Pat. gewährleistet wird.

Das hohe Maß an individueller Variation, sowie das unterschiedliche Evidenzniveau resultierender Empfehlungen erfordert eine genaue Beachtung des klinischen Verlaufs und eine sorgfältige Abwägung bei der Integration ggf. experimenteller Therapieoptionen in die weitere Therapie.

Idealerweise sollten nicht zugelassene Therapieoptionen im Rahmen prospektiver klinischer Studien stattfinden, die Verfügbarkeit solcher Studien sollte daher im Rahmen der Therapieempfehlung mit evaluiert und zumindest auf nationaler Ebene geprüft werden. Oftmals macht eine Umsetzung der Therapieempfehlung jedoch einen Medikamenteneinsatz off-label erforderlich. Hierbei sollte das Evidenzniveau der empfohlenen Therapie mit Blick auf den zu erwartenden Pat.-Nutzen besonders beachtet werden. Eine Nachverfolgung von off-label Therapien sollte im Rahmen von Registerstudien erfolgen (s.u.).

8 Follow-Up

Die hohe Frequenz nicht zugelassener Therapieempfehlungen und fehlender klinischer Daten legt die Integration einer forschenden Versorgung in der Präzisionsonkologie nahe. Insbesondere Umsetzungsraten zielgerichteter Therapien und Therapieansprechen auf off-label Therapien sollten weitgehend nachvollzogen und strukturiert dokumentiert werden (vgl. Kerndatensätze der Medizininformatikinitiative). Idealerweise sollte dies im Rahmen einer prospektiven Registerstudie erfolgen und Daten in einem Netzwerk zusammenfassen, wobei mehrere wissenschaftliche Netzwerke hier aktuell wichtige Beiträge leisten. Eine konsequente Erfassung molekularer Veränderungen kann somit perspektivisch auch bei selteneren Tumoren zu einem verbesserten Verständnis molekularer Veränderungen und effektiver Therapieoptionen führen.

9 Literatur

1. Avila M, Meric-Bernstam F. Next-generation sequencing for the general cancer patient. Clin Adv Hematol Oncol 2019;17:447-454. [PMID:31449513](#)
2. Bonneville R, Krook MA, Kautto EA et al. Landscape of microsatellite instability across 39 cancer types. JCO Precis Oncol 2017;2017:PO.17.00073. [DOI:10.1200/PO.17.00073](#)
3. Cancer Genome Atlas Network. Genomic classification of cutaneous melanoma. Cell 2015;161:1681-1696. [DOI:10.1016/j.cell.2015.05.044](#)
4. Chakravarty D, Johnson A, Sklar J et al. Somatic genomic testing in patients with metastatic or advanced cancer: ASCO provisional clinical opinion. J Clin Oncol 2022;40:1231-1258. [DOI:10.1200/JCO.21.02767](#)
5. Gouda MA, Nelson BE, Buschhorn L, Wahida A, Subbiah V. Tumor-agnostic precision medicine from the AACR GENIE database: clinical implications. Clin Cancer Res 2023;29:2753-2760. [DOI:10.1158/1078-0432.CCR-23-0090](#)
6. Horak P, Griffith M, Danos AM et al. Standards for the classification of pathogenicity of somatic variants in cancer (oncogenicity): Joint recommendations of Clinical Genome Resource (ClinGen), Cancer Genomics Consortium (CGC), and Variant Interpretation for Cancer Consortium (VICC). Genet Med 2022;24:986-998. [DOI:10.1016/j.gim.2022.01.001](#)

7. Horak P, Leichsenring J, Goldschmid H et al. Assigning evidence to actionability: An introduction to variant interpretation in precision cancer medicine. *Genes Chromosomes Cancer* 2022;61:303-313. DOI:[10.1002/gcc.22987](https://doi.org/10.1002/gcc.22987)
8. Hussen BM, Abdullah ST, Salihi A et al. The emerging roles of NGS in clinical oncology and personalized medicine. *Pathol Res Pract* 2022;230:153760. DOI:[10.1016/j.prp.2022.153760](https://doi.org/10.1016/j.prp.2022.153760)
9. Illert AL, Stenzinger A, Bitzer M et al. The German Network for Personalized Medicine to enhance patient care and translational research. *Nat Med* 2023;29:1298-1301. DOI:[10.1038/s41591-023-02354-z](https://doi.org/10.1038/s41591-023-02354-z)
10. Leichsenring J, Horak P, Kreutzfeldt S et al. Variant classification in precision oncology. *Int J Cancer* 2019;145:2996-3010. DOI:[10.1002/ijc.32358](https://doi.org/10.1002/ijc.32358)
11. Li MM, Datto M, Duncavage EJ et al. Standards and guidelines for the interpretation and reporting of sequence variants in cancer: a joint consensus recommendation of the Association for Molecular Pathology, American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists. *J Mol Diagn* 2017;19:4-23. DOI:[10.1016/j.jmoldx.2016.10.002](https://doi.org/10.1016/j.jmoldx.2016.10.002)
12. Mateo J, Chakravarty D, Dienstmann R et al. A framework to rank genomic alterations as targets for cancer precision medicine: the ESMO Scale for Clinical Actionability of molecular Targets (ESCAT). *Ann Oncol* 2018;29:1895-1902. DOI:[10.1093/annonc/mdy263](https://doi.org/10.1093/annonc/mdy263)
13. Mock A, Teleanu MV, Kreutzfeldt S et al. NCT/DKFZ MASTER handbook of interpreting whole-genome, transcriptome, and methylome data for precision oncology. *NPJ Precis Oncol* 2023;7:109. DOI:[10.1038/s41698-023-00458-w](https://doi.org/10.1038/s41698-023-00458-w)
14. Pallarz S, Benary M, Lamping M et al. Comparative analysis of public knowledge bases for precision oncology. *JCO Precis Oncol* 2019;3:PO.18.00371. DOI:[10.1200/PO.18.00371](https://doi.org/10.1200/PO.18.00371)
15. Rieke DT, de Bortoli T, Horak P et al. Feasibility and outcome of reproducible clinical interpretation of high-dimensional molecular data: a comparison of two molecular tumor boards. *BMC Med* 2022;20:367. DOI:[10.1186/s12916-022-02560-5](https://doi.org/10.1186/s12916-022-02560-5)
16. Tortora G, Sessa C, Scarpa A, Banerjee S (eds.) ESMO Handbook of translational research, 2nd edition. ESMO Press Viganello-Lugano 2015.
17. Yan M, Schwaederle M, Arguello D, Millis SZ, Gatalica Z, Kurzrock R. HER2 expression status in diverse cancers: review of results from 37,992 patients. *Cancer Metastasis Rev* 2015 Mar;34:157-164. DOI:[10.1007/s10555-015-9552-6](https://doi.org/10.1007/s10555-015-9552-6)

15 Anschriften der Verfasser

Prof. Dr. med. Michael Bitzer

Eberhard-Karls-Universität Tübingen

Medizinische Universitätsklinik; Gastroenterologie, Gastrointestinale Onkologie, Hepatologie, Infektiologie, Geriatrie

Otfried-Müller-Str. 10

72076 Tübingen

m.bitzer@med.uni-tuebingen.de

Univ.-Prof. Dr. med. Annalen Bleckmann

Uniklinikum Münster

Medizinische Klinik A

Hämatologie, Onkologie, Pneumologie

Albert-Schweitzer-Campus 1

48149 Münster

annalen.bleckmann@ukmuenster.de

Dr. med. Alexander Desuki

UCT Mainz der Universitätsmedizin Mainz
Langenbeckstr. 1
55131 Mainz
alexander.desuki@unimedizin-mainz.de

Prof. Dr. med. Thomas Ernst

Universitätsklinikum Jena
Klinik für Innere Medizin II
Am Klinikum 1
07747 Jena
thomas.ernst@med.uni-jena.de

Prof. Dr. med. Irene Esposito

Universitätsklinikum Düsseldorf
Institut für Pathologie
Moorenstr. 5
40225 Düsseldorf
irene.esposito@med.uni-duesseldorf.de

PD Dr. med. Armin Gerger

Landeskrankenhaus-Universitätsklinikum Graz
Klinische Abteilung Onkologie
Auenbrugger Platz 15
A-8036 Graz
armin.gerger@medunigraz.at

Prof. Dr. med. Hanno Glimm

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Dresden
Translationale Medizinische Onkologie
Fetscherstr. 74/PF 64
01307 Dresden
hanno.glimm@nct-dresden.de

PD Dr. med. univ. Peter Horak

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen
(NCT) Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 460
69120 Heidelberg
peter.horak@nct-heidelberg.de

Dr. Dr. Daniel Hübschmann

Nationales Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg
Research Group Computational Oncology
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
d.huebschmann@dkfz-heidelberg.de

Univ. Prof. Dr. med. Anna Lena Illert

Universitätsmedizin Göttingen
Klinik für Hämatologie und
Medizinische Onkologie
Robert-Koch-Str. 40
37075 Göttingen
lana.illert@med.uni-goettingen.de

Prof. Dr. med. Volker Kunzmann

Universitätsklinikum Würzburg
Zentrum Innere Medizin (ZIM)
Medizinische Klinik und Poliklinik II
Oberdürrbacher Str. 6, Haus A3
97080 Würzburg
Kunzmann_V@ukw.de

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Sonja Loges

Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg
Universitätsklinikum Mannheim
III. Medizinische Klinik
Theodor-Kutzer-Ufer 1-3
68167 Mannheim
Sonja.Loges@umm.de

Dr. med. Ina Pretzell

Universitätsklinikum Essen
Westdeutsches Tumorzentrum Essen
Zentrum für Personalisierte Medizin
Hufelandstr. 55
45147 Essen
Ina.Pretzell@uk-essen.de

PD Dr. med. Damian Rieke

Charité Universitätsmedizin Berlin, Campus Benjamin Franklin
Medizinische Klinik m.S. Hämatologie, Onkologie und Tumorummunologie
Hindenburgdamm 30
12203 Berlin
damian.rieke@charite.de

Dr. med. Katja Schmitz

Krankenhaus St. Vinzenz
Pathologie-Labor Dr. Obrist Dr. Brunhuber OG
Klostergasse 1
A-6511 Zams
katja.schmitz@tyrolpath.at

PD Dr. med. Andreas Seeber

Universitätsklinik für Innere Medizin V
Innsbruck
Anichstr. 35
A-6020 Innsbruck
andreas.seeber@tirol-kliniken.at

Bärbel Söhlke

Zielgenau e.V.
Patienten-Netzwerk für Personalisierte Lungenkrebstherapie
Kerpener Str. 62
50937 Köln
baerbel.soehlke@zielgenau.org

Prof. Dr. med. Dr. phil. Andreas Wicki

Universitätsspital Zürich
Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie
Rämistr. 100
CH-8091 Zürich
andreas.wicki@usz.ch

Prof. Dr. med. Jürgen Wolf

Universitätsklinik Köln
Centrum für Integrierte Onkologie
Kerpener Str. 62
50937 Köln
juergen.wolf@uk-koeln.de

16 Offenlegung potentieller Interessenkonflikte

nach den [Regeln der tragenden Fachgesellschaften](#)

Autor*in	Anstellung¹	Beratung / Gutachten²	Aktien / Fonds³	Patent / Urheberrecht / Lizenz⁴	Honorare⁵	Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen⁶	Andere finanzielle Beziehungen⁷	Persönliche Beziehung zu Vertretungsberechtigten⁸
Bitzer, Michael	Universitätsklinikum Tübingen, Eberhard-Karls Universität, Tübingen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bleckmann, Annalen	Universitätsklinikum Münster, Medizinische Klinik A, Hämatologie u. Onkologie, und Westdeutsches Tumorzentrum	Ja Bayer, BMS, Take-da, Onko-wissen TV, MSD, Boehringer, AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Strea-medup, Lilly, Art Tem-pi, Amgen, RG GmbH, Roche, No-vartis, Digimed Verlag, Janssen, Daiichi	Nein	Nein	Ja Bayer, BMS, Take-da, Onko-wissen TV, MSD, Boehringer, AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Strea-medup, Lilly, Art Tem-pi, Amgen, RG GmbH, Roche, No-vartis, Digimed Verlag, Janssen, DGHO Ju-niorakade-mie, Ärztekammer, Pius Hospi-tal Onsa-brück, St. Jo-hannes Hospital DO, WTZ, Daiichi, FOMF, Knapp-schaftkran-kenhaus Bochum	Ja Studiengel-der für Pati-entenrekru-tierung: Bayer, BMS, Astra-Zeneca, Daiichi, Charité Ber-lin, Uniklin-ik Essen, Kranken-haus Nord-west gGmbH, Janssen, Eli Lilly Cork Limited, Servier, Im-matics	Ja Reisekos-tenerstat-tungen: Bayer, BMS, Take-da, Onko-wissen TV, MSD, Boehringer, AstraZeneca, Sanofi, Pfizer, Strea-medup, Lilly, Art Tem-pi, Amgen, RG GmbH, Roche, No-vartis, Digimed Verlag, Janssen, DGHO Ju-niorakade-mie, Ärztekammer, Pius Hospi-tal Osnabrück, St. Johannes Hospital DO, WTZ, Daiichi, FOMF, Knapp-schaftkran-kenhaus Bochum	Nein
Desuki, Alexander	Universitätsmedizin Mainz	Ja Origenis	Nein	Nein	Ja Janssen, Roche, BMS, MSD, Servier, Eisai	Nein	Nein	Nein
Ernst, Thomas	Universitätsklinikum Jena	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Esposito, Irene	Universitätsklinikum Düsseldorf	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gerger, Armin	Medizinische Universität Graz	Ja Roche	Nein	Nein	Ja Roche	Ja Roche	Nein	Nein

Autor*in	Anstellung¹	Beratung / Gutachten²	Aktien / Fonds³	Patent / Urheberrecht / Lizenz⁴	Honorare⁵	Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen⁶	Andere finanzielle Beziehungen⁷	Persönliche Beziehung zu Vertretungsberechtigten⁸
Glimm, Hanno	National Center for Tumor Diseases Dresden (NCT/UCC), a partnership between DKFZ, Faculty of Medicine and University Hospital Carl Gustav Carus, TUD Dresden University of Technology, and Helmholtz-Zentrum Dresden - Rossendorf (HZDR), Germany	Nein	Ja Fonds mit Beteiligung von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Horak, Peter	Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberg, Deutschland	Ja Platomics	Nein	Nein	Ja Roche Trillium	Nein	Nein	Nein
Hübschmann, Daniel	Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Illert, Anna Lena	TUM Universitätsklinikum und Universitätsklinikum Freiburg	Ja Advisory Board: Illumina, Janssen, Roche, Takeda, Incyte, SOBI	Nein	Nein	Ja Vortragstätigkeit: Takeda, Roche, Janssen, Astra-Zeneca, ASH Today, Onkowissen, Beigene,	Nein	Ja Reisekostenerstattung: Roche, Janssen, Takeda, Astra-Zeneca	Nein
Kunzmann, Volker	Universitätsklinikum Würzburg	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Loges, Sonja	Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg Theodor-Kutzer-Ufer 1-3 68167 Mannheim	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja Roche, BerGenBio, Lilly, ADC Therapeutics, Daiichi Sankyo, Astra-Zeneca	Nein	Nein

Autor*in	Anstellung ¹	Beratung / Gutachten ²	Aktien / Fonds ³	Patent / Urheberrecht / Lizenz ⁴	Honorare ⁵	Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen ⁶	Andere finanzielle Beziehungen ⁷	Persönliche Beziehung zu Vertretungsberechtigten ⁸
		Lilly, Sanofi, BerGenBio, Novartis, Boehringer Ingelheim BMS, Roche, AstraZeneca, MSD, Merck, Sanofi-Aventis, Janssen, Takeda, Pfizer, Amgen, Bayer, Medac, Daiichi Sankyo			Lilly, Sanofi, BerGenBio, Novartis, Boehringer Ingelheim BMS, Roche, AstraZeneca, MSD, Merck, Sanofi-Aventis, Janssen, Takeda, Pfizer, Amgen, Bayer, Medac, Daiichi Sankyo			
Pretzell, Ina	- aktuell: Universitätsklinikum Essen - bis 08/22: MD Nordrhein	Nein	Nein	Nein	Ja ZPM-Fachexpertentätigkeit für die DKG (Honorare über Onkozert)	Nein	Nein	Nein
Rieke, Damian	Charité - Universitätsmedizin Berlin	Ja BeiGene, J&J	Nein	Nein	Ja Roche, BMS, Bayer, Lilly	Ja Seagen	Ja Bayer (Reisekostenerstattung)	Nein
Schmitz, Katja	Tyrolpath GmbH, Zams, Österreich KH St. Vinzenz, Zams, Österreich Innpath GmbH, Innsbruck, Österreich	Ja Amgen AstraZeneca Bayer Daiichi-Sankyo Diagnostics Discovery Life Sciences Incyte Janssen Merck MSD Novartis Pfizer Roche Sanofi Servier Stemline	Nein	Nein	Ja Amgen AstraZeneca Bayer Daiichi-Sankyo Diagnostics Discovery Life Sciences Incyte Janssen Merck MSD Novartis Pfizer PharmaMar Roche Sanofi Servier Stemline Takeda Targos GmbH	Nein	Ja Amgen AstraZeneca Bayer Daiichi-Sankyo Janssen Merck MSD Novartis PharmaMar Roche Sanofi	Nein
Seeber, Andreas	Universitätsklinik für Innere Medizin V (Hämatologie und Onkologie), Medizinische Universität Innsbruck	Ja Caris Life Sciences, Servier, Merck	Nein	Nein	Ja Stemline, Caris Life Sciences, Servier, Merck, Roche, Pierre Fabre, Pharmamar	Ja Gilead, Pharmamar	Nein	Nein
Söhlke, Bärbel	NA	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Wicki, Andreas	Universität und Universitätsspital Zürich	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein

Autor*in	Anstellung ¹	Beratung / Gutachten ²	Aktien / Fonds ³	Patent / Urheberrecht / Lizenz ⁴	Honorare ⁵	Finanzierung wissenschaftlicher Untersuchungen ⁶	Andere finanzielle Beziehungen ⁷	Persönliche Beziehung zu Vertretungsberechtigten ⁸
						For- schungskol- laboration POP der Universität Zürich und des Univer- sitätsspitals Zürich mit Hoffmann- La Roche (2024 bis 2026)		
Wolf, Jür- gen	Universi- tätsklini- kum Köln Kerpener- straße 62 50937 Köln	Ja Amgen, As- traZeneca, Bayer, BluePrint, BMS, Boeh- ringer-In- gelheim, Chugai, Daiichi San- kyo, Jans- sen, Lilly, Loxo, Merck, Mi- rati, MSD, Novartis, Nuvalent, Pfizer, Pier- re Fabre, Roche, Se- attle Gene- tics, Take- da, Turning Point	Nein	Nein	Ja Amgen, As- traZeneca, Bayer, BluePrint, BMS, Boeh- ringer-In- gelheim, Chugai, Daiichi San- kyo, Jans- sen, Lilly, Loxo, Merck, Mi- rati, MSD, Novartis, Nuvalent, Pfizer, Pier- re Fabre, Roche, Se- attle Gene- tics, Take- da, Turning Point	Nein	Ja Amgen, As- traZeneca, Bayer, BluePrint, BMS, Boeh- ringer-In- gelheim, Chugai, Daiichi San- kyo, Jans- sen, Lilly, Loxo, Merck, Mi- rati, MSD, Novartis, Nuvalent, Pfizer, Pier- re Fabre, Roche, Se- attle Gene- tics, Take- da, Turning Point	Nein

Legende:

¹ - Gegenwärtiger Arbeitgeber, relevante frühere Arbeitgeber der letzten 3 Jahre (Institution/Ort)

² - Tätigkeit als Berater*in bzw. Gutachter*in oder bezahlte Mitarbeit in einem wissenschaftlichen Beirat / Advisory Board eines Unternehmens der Gesundheitswirtschaft (z. B. Arzneimittelindustrie, Medizinproduktindustrie), eines kommerziell orientierten Auftragsinstituts oder einer Versicherung

³ - Besitz von Geschäftsanteilen, Aktien, Fonds mit Beteiligung von Unternehmen der Gesundheitswirtschaft

⁴ - Betrifft Arzneimittel und Medizinprodukte

⁵ - Honorare für Vortrags- und Schulungstätigkeiten oder bezahlte Autor*innen oder Koautor*innenschaften im Auftrag eines Unternehmens der Gesundheitswirtschaft, eines kommerziell orientierten Auftragsinstituts oder einer Versicherung

⁶ - Finanzielle Zuwendungen (Drittmittel) für Forschungsvorhaben oder direkte Finanzierung von Mitarbeiter*innen der Einrichtung von Seiten eines Unternehmens der Gesundheitswirtschaft, eines kommerziell orientierten Auftragsinstituts oder einer Versicherung

⁷ - Andere finanzielle Beziehungen, z. B. Geschenke, Reisekostenerstattungen, oder andere Zahlungen über 100 Euro außerhalb von Forschungsprojekten, wenn sie von einer Körperschaft gezahlt wurden, die eine Investition im Gegenstand der Untersuchung, eine Lizenz oder ein sonstiges kommerzielles Interesse am Gegenstand der Untersuchung hat

⁸ - Persönliche Beziehung zu einem/einer Vertretungsberechtigten eines Unternehmens der Gesundheitswirtschaft